Wanted


入れない・捨てない・広げない「特定外来生物」

ソウシチョウ *Leiothrix lutea*



分　類　鳥綱 スズメ目 チメドリ科
原産地　東アジア、東南アジア

大きさはスズメより少し大きめです。
オスとメスで、大きさや羽色にほとんど
違いはありません。メジロ、コマドリ、コルリ、
ウグイスなど在来鳥類に影響を与えます。
最近では、北摂地域でよく目撃されています。





川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　イラスト／高田みちよ　写真提供／池田哲哉

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」

Wanted


オオキンケイギク　*Coreopsis lanceolata*

WANTED

分　類　維管束植物 双子葉・合弁花類 キク科
原産地　北アメリカ
（ミシガン～フロリダ、ニューメキシコ）



ワイルドフラワー緑化で多用され、河川敷などで野生化しました。
開花期は5～7月。コスモスとよく似たフォルムをしていますが、直径5～7cmの黄色い花を咲かせ、葉のカタチが違います。





川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　イラスト／馬場玲子　写真提供／高田みちよ

Wanted

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」

ウシガエル *Rana catesbeiana*

WANTED

分　類　両生綱 無尾目 アカガエル科
原産地　アメリカ東部・中部、カナダ南東部



繁殖期は長く5～9月。
夜になるとオスは「ンブォー、
ンブォー」と大きな鳴き声を立てます。
動くもので口に入るサイズなら、何でも食べるという
食いしん坊。さまざまな在来の生物を捕食しています。



体長20cm前後で、ひときわ大きい
深く流れの穏やかな水域を好む



川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー
RIVER RANGER

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　イラスト／岡田貴子　写真提供／川島大助

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」

Wanted


オオクチバス *Micropterus salmoides*

WANTED

分　類　硬骨魚綱 スズキ目 サンフィッシュ科
原産地　北アメリカ



1925年に輸入され、ルアー釣りのブームによって分布を広げました。
今では日本のほとんどの川や湖、池に生息しています。
産卵期は4～7月、メス1匹当たりの抱卵数は2,000～145,000個で、
徹底的に駆除する必要があります。



体長30～50cm



川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　イラスト／岡田貴子　写真提供／成魚：石山郁慧　稚魚：川島大助

Wanted

入れない・捨てない・広げない　「特定外来生物」


ブルーギル *Lepomis macrochirus*

WANTED

分　類　硬骨魚綱 スズキ目 サンフィッシュ科
原産地　北アメリカ東部



日本には1960年に輸入されました。
青い斑紋があることから、この名前が付けられたと言われています。
産卵期は6～7月、1回の産卵数21,000～36,000個です。
繁殖力が強く、在来魚の卵や稚魚を食べ尽くします。



在来魚の卵や稚魚を食い尽くす



川と人　人と人を結ぶ
河川レンジャー

参考資料／環境省　特定外来生物同定マニュアル、独立行政法人国立環境研究所　侵入生物データベース
企画構成／石山郁慧　デザイン／泉野幸彦　イラスト／岡田貴子　写真提供／成魚：河合典彦　稚魚：川島大助